

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 2-5-66 501403

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION D'ORLÉANS (Tél. 87-45-41)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, NIÈVRE, YONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS.

C. C. P. : ORLÉANS 4.604-25

ABONNEMENT ANNUEL

15 Francs

Supplément n° 4 au Bulletin n° 67 d'Avril 1966

25 Avril 1966

- 11 -

AVERTISSEMENTS

VIGNE

BLACK-ROT DE LA VIGNE

Les projections d'ascospores sont déjà nombreuses. Des contaminations peuvent donc avoir lieu sur toutes les vignes qui ont au moins une feuille étalée (stade D-E).

Afin d'éviter ces premières contaminations toujours dangereuses car elles sont à l'origine des attaques sur grappes, il y a lieu d'effectuer un traitement dès réception de ce bulletin en utilisant un des produits mentionnés dans la liste qui a été remise à chaque abonné. Dans les vignes où le stade D-E n'est pas atteint, il y a lieu d'attendre que la majorité des bourgeons arrive à ce stade pour traiter.

Nous rappelons que les hybrides producteurs directs peuvent également être contaminés par le Black-rot.

Dans les communes des départements du Cher et de l'Indre contaminées par le Black-rot et qui ont été définies par des arrêtés préfectoraux, les traitements conseillés contre cette maladie sont obligatoires sur tous les cépages.

INFORMATIONS

CULTURES OLEAGINEUSES

CHARANCON DES SILIQUES

Le nombre des femelles susceptibles de pondre qui était resté faible jusqu'à ces derniers jours augmente très rapidement.

Il est donc conseillé d'effectuer un traitement contre ce ravageur en utilisant un des produits conseillés dans la liste qui a été remise à chaque abonné.

Nous insistons sur le fait que seuls les produits non toxiques pour les abeilles doivent être utilisés dès que le nombre de fleurs ouvertes est supérieur à 100 par mètre carré. Dans la liste des produits homologués et en autorisation provisoire de vente, seules les matières actives suivantes ont été reconnues non toxiques pour les abeilles : TOXAPHENE, POLYCHLOROCAMPHANE, ENDOSULFAN, PHOSALONE et PYRETHRINES.

CECIDOMYIE DES SILIQUES

Le traitement effectué contre le Charançon des siliques sera également efficace contre ce ravageur qui est déjà apparu dans les cultures.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
agricoles,

G. RIBAUT.
B. PACQUETEAU.

L'Inspecteur de la Protection des
Végétaux,

G. BENAS.

P 124

Imprimé à la Station d'Orléans -

Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.